

浸水した家屋の感染症対策

感染症予防のためには

清掃と乾燥が

最も重要です

屋外※では消毒は原則不要です

※特に床下や庭など

床上浸水の場合

水が引いたら・・・

手順1 不要なものや汚泥を片付ける

手順2 浸水した場所を水で洗い流す。

※流せない場合は雑巾等によく拭き取る。

手順3 よく乾燥させる。

手順4 消毒薬を使用する。

※裏面の使用方法をご覧ください。

※消毒薬を配布しますので、自治会を通じて地区市民センターへ住家被害状況報告を行ってください。



床下浸水の場合

水が引いたら・・・

手順1 不要なものや汚泥を片付ける

手順2 浸水した場所を水で洗い流す。

手順3 よく乾燥させる。

屋外(床下や庭)では消毒は原則不要です。

※消毒は原則不要ですが、要望があれば消毒薬を配布します。(自治会を通し地区市民センターへ住家被害状況報告を行ってください。)



消毒薬の使い方

作業時には、長袖・長ズボン・メガネ・マスク・ゴム手袋などを着用してください。

【使用方法】

塩化ベンザルコニウム液10%(逆性石鹼) ※使用期限にご注意ください！！

100倍希釈の例：ペットボトルの蓋1杯分の消毒薬原液(約5ml)と500mlのペットボトル1本分の水道水

200倍希釈の例：ペットボトルの蓋1杯分の消毒薬原液(約5ml)と500mlのペットボトル2本分の水道水

〔家屋・家具等〕

汚れた床や壁、家具等を十分に水洗いするか水拭きし、乾燥させた後、塩化ベンザルコニウム液10%を100倍に希釈した液を浸した布(雑巾等)でふき取ってください。もしくは霧吹き等で噴霧してください。

※子供やペット等が消毒した箇所を舐める恐れがある場合には、消毒後に水拭きを行ってください。

〔食器・調理器具等〕

汚れた食器・調理器具を十分に水洗いし、塩化ベンザルコニウム液10%を200倍に希釈した液に30分間浸した後、よく水洗いしてください。


〔屋外・床下等〕

消毒を行う場合は、泥や汚れを水でよく流し、乾燥させた後、塩化ベンザルコニウム液10%を100倍に希釈した液をじょうろ等で散布してください。

※汚れが残っている状態または乾燥していない状態では十分な効果が得られない場合があります。

【注意事項】

小分けしない！




誤飲事故が起こる危険性が高まります。

放置しない！



乳幼児の手の届かない場所で、食品と別に保管してください。

直接さわらない！



皮膚についたときは、水で十分洗い流してください。